

# ハーボニー<sup>®</sup>配合錠を ボトルで調剤される薬剤師の皆様へ

—ボトルの開け方のご案内—

乳幼児による誤飲を防止するため、本剤のボトルではキャップを開けにくい構造にしています。キャップの開け方を患者様と一緒に試していただくなど、ご指導をお願いいたします。また、ボトル内の詰め物と乾燥剤(シリカゲル)の誤飲にご注意いただくよう患者様へお伝えいただくか、調剤の際に取り除いてお渡しください。

- 1 ボトルをつかみ、  
キャップを上から下に  
押しこんでください。



- 2 キャップを下に押しながら、  
左方向に回す(反時計回り)と  
キャップを開けることが  
できます。




※キャップを閉める際は、右方向に回す(時計回り)だけで閉まります。キャップを押しこむ必要はありません。

キャップの開け閉めについては、患者様に複数回ご指導ください。


3

アルミのシールに、  
スプーンの柄などで  
穴を開けてください。



4


お薬を取り出す  
さまたげにならないよう、  
アルミのシールを  
取り除くか、  
内側に折り曲げて  
ください。



※その際、ケガをしないよう気をつけてください。

5

ボトルの中に入っている  
乾燥剤と詰め物を  
完全に取り除き、  
アルミのシールと  
一緒に捨てて  
ください。



※乾燥剤はボトルの底に沈んでいることがあります。  
必ず取り除いてください。